MÉTODO PARA FUNDAR UN PALOMAR DE MENSAJERAS

Autor - Dr Anderson - Escocia – 1947

Traducción del ingles – Néstor Diego

EL PALOMAR

Primero es necesario construir un palomar adecuado y organizar el alojamiento de las futuras palomas de base.

Para empezar, se puede hacer una construcción muy sencilla; por ejemplo, una antigua construcción permanente de piedra o ladrillo, como un establo o el piso superior de casi cualquier estructura antigua, a menudo se puede transformar de forma fácil y económica.

En ausencia de alguno de estos elementos, puede ser necesario construir un palomar de madera o ladrillo en el jardín o patio trasero.

Nunca compre un palomar viejo de segunda mano, ya que rara vez es rentable heredar suciedad y enfermedades, por mucho que pueda ahorrar dinero.

Utilice madera fresca y seca si es posible.

En el extranjero, en el norte de Francia y, sobre todo, en Bélgica, los edificios antiguos son muy populares para la construcción de palomares, y el tipo británico de palomar de jardín es muy poco común.

Calculo que más del noventa y cinco por ciento de los palomares allí se encuentran sobre viviendas o en edificios antiguos.

El aficionado extranjero afirma (y creo que con razón) que estos palomares están bien conservados y son completamente secos, y que las palomas alojadas allí disfrutan de una existencia más cómoda, sin grandes variaciones de temperatura, en comparación con nuestras aves en sus palomares abiertos en jardines y en un clima mucho más severo.

De hecho, es una costumbre muy común en Bélgica ver el palomar ocupando toda la planta superior de una vivienda de primera clase y, para comodidad del aficionado, equipado con una escalera interior, etc.

Esto es, en muchos sentidos, una disposición ideal para las palomas y también una gran comodidad para el propio aficionado, ¡pero siempre me sorprende que la dueña de la casa lo permita!

Puede que sea sabia en un aspecto: sabrá dónde está su marido y dónde encontrarlo, si es un aficionado entusiasta.

Al mismo tiempo, no conozco a muchas mujeres de este lado del Canal de la Mancha que aprueben una instalación así.

Sin embargo, este tipo de palomar tiene ciertas desventajas: genera olores en la casa debido al secado de los excrementos y atrae a ratones e innumerables insectos que encuentran un refugio en los herrajes de madera y que son casi imposibles de erradicar.

Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta a los habitantes de la casa; una instalación así no es higiénica desde el punto de vista de la salud pública y no creo que nuestras autoridades locales la aprueben en este país.

En mi opinión, el palomar abierto en el jardín produce un tipo de paloma mensajera más resistente, adecuado para las condiciones rigurosas de nuestro país.

Estoy totalmente a favor de este tipo de palomar porque he comprobado que es satisfacto-

rio en todos los aspectos; y todavía me proporciona mucho placer y relajación ver las aves a mi alrededor en mi propio jardín.

En cualquier caso, el principiante debe elegir el tipo de palomar que mejor se adapte a sus necesidades individuales.

Se construirá siguiendo pautas prácticamente similares, y lo ideal sería construirlo en tres compartimentos, como se indica a continuación:

1. Para aves reproductoras.
2. Para aves de carrera adultas.
3. Para aves jóvenes.



Recomiendo encarecidamente al principiante que visite a algunos buenos colombófilos en su zona.

Así obtendrá mucha información interesante y valiosa sobre la construcción de su palomar.

Debe procurar evitar la sobre población y recordar que las palomas son reproductoras prolíficas e incluso en temporadas de carreras desastrosas, la mayoría de los colombófilos tienen demasiadas aves para invernar.

La longitud de cada uno de los tres compartimentos debe ser de aproximadamente 1,8 metros.

El ancho del nuevo palomar debe ser de 1,8 a 2,1 metros; la altura, de 1,9 metros; y la inclinación del techo, de 30 centímetros, para que las palomas puedan controlarse fácilmente.

Cada compartimento de 1,8 metros puede subdividirse a 90 centímetros mediante una ligera partición de listones de aproximadamente 45 centímetros de profundidad, que se extiende sobre las cajas nido verticalmente hasta el techo.

Las perchas son las mejores del tipo caja; deben ser espaciosas y bastante profundas.

Estas perchas mantienen a las aves limpias y amigables, ya que cada percha de caja constituye un santuario para su ocupante.

Las cajas nido deben construirse frente a la entrada y las perchas, como se describe, deben colocarse encima.

Dos filas de nidos deberían ser suficientes para cada compartimento de 1,80, es decir, seis nidos en total.

Cada caja nido debe ser de un tamaño generoso para permitir la colocación de dos bandejas nidales en cada una; esto será una gran ventaja cuando se pongan los segundos huevos.

Esto evitará que las patas de los pichones dañen los segundos huevos y permitirá que el ave que incuba tenga algo de comodidad y relajación.

Sugiero los siguientes tamaños: aproximadamente 60 cms de largo por 45 de alto y 45 de ancho.

El frente del nido recomendado es uno de barrotes sobre un marco de madera ligera, construido en dos mitades y con bisagras.



Durante la etapa preliminar del apareamiento, la mitad superior puede mantenerse cerrada fácilmente fijándola con un botón de metal o madera.

Una vez que las aves se hayan acostumbrado a su hábitat, puede plegarse como se muestra en los dibujos adjuntos.

Los frentes de nido de este tipo son sencillos e ideales para evitar peleas con los machos vecinos.

Si se producen peleas, como suele ocurrir, incluso en las familias de palomas mejor reguladas, la salida es amplia y muy obvia, y el agresor suele ser expulsado fácilmente.

De esta forma, se evitan accidentes como huevos rotos, arrancamiento de las plumas de los concursantes y rotura de las plumas primarias.

Esto último es un problema grave con la llegada de la temporada de carreras de palomas.

Todas las catástrofes mencionadas son comunes y muy propensas a ocurrir cuando la salida del frente del nido es del tipo de percha pequeña o plataforma de aterrizaje, tan universalmente utilizada.

Los frentes deben pintarse en diversos colores, por ejemplo, rojo, blanco y azul, para ayudar a las aves a reconocer sus propios nidos.

Cabe mencionar aquí la gran ventaja de probar solo una o dos parejas a la vez durante las primeras etapas del apareamiento.

Asegúrese de que cada pareja conozca bien su nido antes de dar a las demás plena libertad.

La ventilación debe realizarse mediante un espacio bajo el techo que se extienda en toda su longitud por todos lados; y también desde los frentes abiertos que se describirán más adelante.

Se deben colocar puertas en cada extremo y el palomar debe construirse al menos a un metro o metro y medio del suelo, preferiblemente sobre pilares de ladrillo u hormigón.

También se puede aislar en los pilares colocando trozos de fieltro o láminas de goma planas entre los pilares y los soportes o vigas del suelo (esta es una práctica común en el extranjero).

Con un espacio de un metro o metro y medio bajo el desván, siempre habrá una buena corriente de aire, lo que mantendrá el suelo seco y reducirá las posibilidades de infecciones y epidemias.

También evitará que merodeadores como ratas y gatos se escondan bajo el suelo del desván.

Otra ventaja es que se puede instalar fácilmente una plataforma de madera de buen tamaño frente a la entrada de puerta abierta, lo que facilitará el aterrizaje y la captura durante las carreras.

La captura debe realizarse mediante el método de puerta abierta, que se describirá con más detalle más adelante en la sección sobre "viudez".

Las dos puertas de medio cristal tienen aproximadamente 1,65 metros de alto y 70 centímetros de ancho, y deben colocarse frente al compartimento central o palomar de carreras.

Funcionan con resortes y se pueden abrir con cuerdas o alambres dentro y fuera del palomar.

Incluso en esta etapa inicial de la planificación y el montaje del nuevo palomar, es absolutamente imperativo que el joven colombófilo comprenda la importancia del control de sus palomas y la absoluta necesidad de una captura rápida.

Hoy en día, con una competencia tan intensa, las carreras se ganan y se pierden en el final de la carrera.

Hay pocas cosas más humillantes para un colombófilo que ver a una buena paloma quedarse sentada el tiempo justo para perder la posición que ha ganado en vuelo.

Además, se deben instalar las trampas habituales para el palomar de cría y para el de pichones, una plataforma de aterrizaje de buen tamaño (que se pueda plegar cuando no se use) y un juego de alambres de fijación controlados de la forma habitual solo para la entrada.

Menciono el plegado del tablero exterior porque en las carreras de palomas viejas solo debe haber la puerta abierta si se busca una captura rápida.

Si se considera aconsejable durante la temporada de carreras de palomas jóvenes, también se puede usar la trampa de puerta abierta; solo se necesita erigir una división ligera de listones para desviar a los pichones a su propio palomar.

Debe haber ventanas en la parte delantera de los palomares de las palomas reproductoras y de las palomas jóvenes, cada una de aproximadamente un metro de ancho y un metro y medio de alto.

Deben estar hechas y fijadas con cuerdas para que se puedan abrir según sea necesario y facilitar la salida de las palomas cuando se saca a las palomas a hacer ejercicio.

Para que entre aire, en climas cálidos, se deben poder reemplazar con marcos con barrotes.

Se debe agregar un aviario de malla metálica al compartimento de las palomas reproductoras.

Es absolutamente necesario cuando las palomas reproductoras son prisioneras y también si se espera criar buenos pichones.

Cuanto más grande sea el aviario, mejor cumplirá su función.

También prolongará la vida de las aves reproductoras y, entre otras cosas, será útil para bañarlas semanalmente, ya que ayudará a mantener secos los suelos del palomar.

Finalmente, permitirá a las prisioneras una buena vista de su entorno, lo cual será fundamental durante su instalación en su nuevo hogar.

Recuerde que siempre es mejor aquerenciar a todas las prisioneras.

De lo contrario, no podrán reproducirse satisfactoriamente durante mucho tiempo.

El baño para las corredoras y los pichones se realiza mejor en el jardín; este método mantiene los suelos secos y he observado que las aves lo prefieren al aire libre incluso en los días más fríos.

La orientación del palomar debe ser sur-sureste para que las aves puedan disfrutar al máximo de la luz solar.

La iluminación nunca debe realizarse mediante claraboyas en el palomar abierto, ya que estas no son adecuadas en los edificios de madera.

La mejor iluminación se consigue mediante ventanas en la parte delantera del palomar, como se ha descrito, y mediante trampillas acristaladas que se abren, como ya se ha descrito.

El palomar descrito está equipado con todo lo esencial y debería ser cómodo para las palomas.

Tras cuarenta y cinco años de experiencia, este palomar, debo añadir que cumpliría con todos mis requisitos, si tuviera que construir uno nuevo hoy.

PALOMAS DE BASE

Ahora será necesario considerar las palomas de base.

Recomiendo encarecidamente al principiante que, en esta etapa, comprenda que solo las mejores palomas son suficientes.

Existen varios métodos para iniciar un palomar, pero me contentaré con sugerir dos buenas maneras, las cuales recomiendo con total confianza:

(1) Comprando de cuatro a seis parejas de pichones, o

(2) Comprando de cuatro a seis parejas de palomas reproductoras de confianza.

Ambos métodos tienen ciertas ventajas.

En el primero, es relativamente fácil para el principiante comprar pichones de primera clase de la mejor sangre, pero es muy distinto comprar parejas reproductoras probadas y ganadoras.

El viejo aficionado siempre venderá crías de sus mejores parejas, pero generalmente será muy reacio a desprenderse de parejas de reserva de valor probado, a menos que se sienta tentado por precios altos o a menos que esté abandonando el deporte.

Si se adopta el método número uno, el joven colombófilo adquirirá experiencia progresivamente en el manejo de sus pichones y, si lo desea más adelante, en el entrenamiento y la participación en el programa de carreras de pichones de la temporada.

Sin embargo, si sigue mi consejo, se encargará de entrenar a sus pichones durante un tiempo limitado y luego los reservará para que crezcan y se desarrollen para la siguiente temporada reproductiva.

Puede olvidarse de las carreras de pichones hasta que pueda disfrutarlas plenamente y arriesgar su propia producción.

Si opta por el método número dos y compra parejas de cría, podrá criar sus propios pichones para las carreras y, además, adquirirá la experiencia añadida de entrenarlos.

En mi opinión, los pichones se desarrollan mejor en el palomar donde nacen.

Sea cual sea el método que adopte, el joven colombófilo debería contactar con un buen colombófilo de larga distancia, preferiblemente de su zona, a quien pueda comprar sus ejemplares.

Sin duda, de esta manera, el principiante puede familiarizarse con dicho palomar y aprender mucho sobre su manejo, etc.

Tras varias visitas a un palomar de este tipo, podrá aprender más que con muchas semanas de lectura de diversos folletos de palomas y artículos de prensa especializada.

Más adelante, estará en mejor posición para apreciar el material de dichas fuentes.

El apareamiento de las parejas reproductoras debe seguir las pautas sugeridas por el colombófilo experimentado al que se adquirieron.

Los yearlings suelen tener buena descendencia y muchos campeones han surgido de estas uniones.

Las hembras viejas nunca son muy fiables, especialmente en manos de principiantes, y los machos viejos pueden aparearse con hembras de dos años a menudo con resultados satisfactorios.

El Dr Bricoux debe gran parte de su éxito a los machos viejos una vez finalizada su etapa en las carreras.

LA CRIANZA

Las parejas pueden aparearse a finales de febrero y, si el clima lo permite, debería ser posible criar dos nidos de pichones (o cuatro aves) de cada pareja, a tiempo para las carreras de pichones.

Si el principiante tiene que comprar y usar varios pares de comederos para las parejas de cría, podría ser una ventaja y compensaría con creces la pequeña inversión.

Cuando los pichones eclosionan, alrededor del decimonoveno día, se deben examinar las cáscaras de los huevos para comprobar si están limpias y secas.

Si están sucias y contienen restos de sangre, no es buena señal, y será necesario examinar a los pichones.

Si se observa hinchazón del ombligo o algún resto del tendón umbilical, lo mejor será sacrificar al pichón recién nacido.

Es bien sabido que esto es signo de debilidad y debilidad, y que un pichón así nunca será útil como paloma mensajera.

Alrededor del décimo día después de la eclosión, se debe espolvorear generosamente a los pichones del nido y al propio nido con un insecticida, como el polvo Keatings o el polvo DDT.

El nido debe cambiarse aproximadamente al cabo de dos semanas y espolvorearse con in-

secticida en polvo como se indicó anteriormente; es mejor no molestar a los pichones en el nido más de lo necesario.

Muchos colombófilos no interfieren con ellos, salvo para anillarlos con sus anillas metálicas y quizás para un cambio de bandeja.

De la pareja de cría, se debe criar un tercer nido para futuras reposiciones; es posible que se les pida que reemplacen a las aves que se pierdan durante la aducción.

LA ADUCCIÓN

Nuevamente, recomiendo al principiante que aquerencie a sus aves de cría y no tenga ninguna prisionera.

Antes de proceder con la aducción, recomiendo que todas las aves se transfieran al nuevo propietario a través del secretario de la Unión correspondiente.

La aducción es una operación bastante delicada y se requiere mucha paciencia y cuidado para tener éxito.

Me gustaría hacer las siguientes sugerencias prácticas:

1. Desde sus primeros días en el palomar, permita que las prisioneras usen una jaula (de alambre o barrotes) que se puede colocar en el techo plano y conectar con la trampa pequeña para la entrada.

2. Preferiblemente, espere hasta que la pareja haya puesto el tercer par de huevos.

3. Permita que el ave que intenta aquerenciar (en este caso, el macho) se tome su tiempo para salir de la jaula por la puerta abierta.

Bajo ninguna circunstancia se debe abrumar ni interferir con él de ninguna manera, o el experimento casi con seguridad resultará en un desastre.

4. Un buen momento sería al atardecer, después de que todo esté tranquilo, y si llueve un poco, mucho mejor.

El ave normalmente emprenderá el vuelo, pero si es tarde, es probable que no se aleje mucho de los límites.

5. Coloque la segunda ronda de pichones en el techo; si aún no están completamente en vuelo, también será una ventaja.

Los pichones serán un atractivo adicional.

He adiestrado a muchos corredores famosos de esta manera y he demostrado que es un método admirable.

No soy partidario de los "bloqueos de alas" ni del afeitado de las plumas de vuelo, y prefiero la amabilidad y la atención a la coerción en este asunto.

A menudo, el ave que estaba acomodando regresaba muy tarde por la noche o muy temprano por la mañana (justo después del amanecer, cuando todo estaba muy tranquilo) y me he acostumbrado a estar presente en esos momentos para ser de toda la ayuda posible en el experimento.

Lamento decir que hay otro factor que rara vez se tiene en cuenta al momento de la acomodación: el ave debe gozar de excelente salud.

Si está demasiado gorda, siempre existe el peligro de que muera en el aire después de intentar volar, especialmente después de un largo cautiverio y sin ningún tipo de ejercicio.

Si su salud es baja por haber sido apareada demasiado pronto, por haber alimentado a demasiadas crías y por un largo confinamiento, se mostrará apática y, al ser liberada, volará a ciegas fuera de la jaula y, tras alejarse demasiado, no podrá intentar regresar a su nuevo palomar, ni siquiera al anterior.

En esos momentos, es casi habitual culpar al antiguo dueño.

Recuerdo que hace unos treinta y cinco años compré dos reconocidos ganadores de la Federación en mi propio distrito a un buen aficionado de confianza.

Más tarde intenté aquerenciarlos y debo admitir que no tomé las precauciones recomendadas, ya que la distancia entre ambos palomares era de tan solo cuatrocientos metros.

Ambas aves simplemente salieron disparadas de la trampa y volaron a una altura impresionante, sin que se volviera a ver ni a saber de ellas.

Alimentarlas con la campana, como se recomienda, también ayuda a que se apacigüen; a veces, el pájaro cansado y hambriento se sentirá atraído por esto, y si está cerca, regresará.

Recuerdo haber aducido al "Campeón Epinard" del Sr Stassart.

Al liberarlo por primera vez, no dudó ni miró a su alrededor, sino que se alzó a una altura impresionante y, tras recorrer un amplio espacio, desapareció.

A altas horas de la noche, lo vimos a una distancia razonable y, al oír la campana de alimentación, tuvo la prudencia de posarse en el tejado del palomar y, para mi sorpresa y alegría, siguió a mi encargado del palomar por la puerta abierta y disfrutó de una buena cena.

Más tarde tuve una experiencia casi similar con el "Ch. Cerf Volant" del Sr Stassart y con varios otros famosos corredores que conseguí instalar con éxito.

Sugiero que, después de instalarse, se permita a la pareja de cría criar un pichón, y que durante ese tiempo se les dé ejercicio y libertad con regularidad.

El secreto del éxito en este asunto es mantener a las aves ocupadas y contentas.

Más adelante, cuando sea necesario separar los sexos, recomendaría mantener a las aves reproductoras en su lugar y no permitirles la libertad hasta que llegue la época de apareamiento en primavera.

Esto es necesario al menos durante el primer invierno tras la instalación.

Si no se lleva a cabo, las aves tienden a desinteresarse y, si el tiempo es malo y hay niebla o nieve en el suelo, pueden deambular y salirse de los límites.

Debido al impredecible destino, casi siempre es un macho o una hembra de estas características el que deja tras de sí un campeón, y después será imposible criar otro igual; casi cualquier aficionado experimentado puede recordar un incidente similar.

EL MANEJO DEL PALOMAR

En cuanto al manejo del palomar (alimentación, ejercicio y entrenamiento, carreras, etc.), pretendo abordarlos en ese orden.

La limpieza del palomar es absolutamente esencial y debe realizarse regularmente dos veces al día: durante el ejercicio en la temporada de carreras y una vez al día en la temporada de invierno.

Es aconsejable pintar el nuevo palomar por dentro y por fuera al momento de la construcción.

Posteriormente, en temporadas posteriores, antes y después de la época de cría, se debe

rociar a fondo con una lechada de cal o temple.

No utilice creosota, ya que es muy peligrosa, especialmente en palomares pequeños.

Los criaderos, que deben ser desmontables, deben retirarse y dejarse al aire libre durante algunos meses durante el invierno.

Esto los limpiará a fondo y los despiojará.

Después, deben lavarse, secarse y prepararse para su montaje cuando llegue la época de cría.

ALIMENTACIÓN

Pocas clases de ganado presentan mayor dificultad de alimentación que las palomas.

No es posible tratar a cada paloma individualmente, por lo que es necesario intentar regular la dieta para que se adapte a la "paloma promedio".

La habilidad en la alimentación es el arte de estimular el apetito y los factores que intervienen incluyen la variedad, la palatabilidad, la regularidad, la cantidad de cada alimento y el ejercicio.

Las palomas responden muy bien a la regularidad de la alimentación y esperarán regularmente al colombófilo en los horarios de alimentación acostumbrados.

Si el colombófilo no acude regularmente, las aves se vuelven irritables e inquietas.

Una cantidad moderada de ejercicio ayudará a abrir el apetito de las aves y también a mantener sus órganos digestivos en buen estado.

La cantidad de alimento es importante, pero depende de las necesidades de las aves, que a su vez varía según el ejercicio realizado, la edad y el sexo.

Los pichones necesitan más que los adultos; los machos, más que las hembras, excepto cuando estas últimas están empollando.

El colombófilo inteligente no se obsesionará con la proporción exacta de los distintos granos que se incorporarán a la dieta, ni tratará el problema de la alimentación como algo simple.

En nuestro estado actual de conocimiento, conocemos ciertas leyes de la naturaleza que deben obedecerse si queremos criar pichones de primera calidad, y el propósito de los siguientes párrafos es describir los principios de la alimentación.

Un análisis del cuerpo de la paloma muestra que contiene seis tipos distintos de sustancias químicas:

1. Proteínas, especialmente en el músculo y las plumas.

2. Grasa, especialmente en el cerebro, los nervios y los depósitos grasos.

3. Carbohidratos, en el hígado y la sangre.

4. Minerales y sales, especialmente en los huesos y la sangre.

5. Vitaminas, en cantidades mínimas en la mayoría de los tejidos.

6. Agua, presente en todos los tejidos y que constituye, con diferencia, el componente individual más importante.

Una breve explicación de la naturaleza de estos componentes ayudará a comprender el problema de la alimentación.

PROTEÍNA

Una proteína es una sustancia química orgánica que, a diferencia de las grasas y los carbohidratos, contiene parte del elemento nitrógeno.

En la vida cotidiana, conocemos las proteínas con diferentes nombres; por ejemplo, la gelatina es una proteína que utilizamos en gelatinas de mesa y en otras gelatinas animales, como la gelatina de pata de ternera; la clara de huevo o albúmina es una proteína; la carne contiene un veinticinco por ciento de proteína.

Las proteínas se disuelven en agua para formar una masa gelatinosa, y cada célula del cuerpo es, en gran medida, una solución de proteína en agua. El punto importante sobre la proteína es que es esencial para la formación de nuevas células en las crías en crecimiento y para reparar el daño celular que se ha fatigado.

Por lo tanto, la proteína puede considerarse el componente fundamental de los alimentos.

La proteína se encuentra en toda la materia viva, animal o vegetal, pero cada especie vegetal y animal tiene un tipo diferente de proteína.

Sin embargo, esta diferencia no es muy grande, ya que análisis posteriores de las proteínas muestran que cada molécula de proteína está compuesta por varias partes más pequeñas llamadas aminoácidos.

Los aminoácidos son los elementos realmente importantes al considerar los valores nutricionales, ya que en el tracto digestivo de la paloma, el estómago y los jugos intestinales descomponen la proteína del alimento en aminoácidos, y son estos aminoácidos los únicos que pueden ser absorbidos por el torrente sanguíneo.

Aunque existen miles de aminoácidos, se ha descubierto que todas las proteínas de plantas y animales están compuestas por unos veinte aminoácidos, y estos veinte se presentan en diferentes proporciones en cada proteína.

Algunas proteínas carecen de ciertos aminoácidos, por ejemplo, La avena carece de los aminoácidos serina, cistina, triptófano, arginina y lisina.

La proteína de la leche, el caseinógeno, contiene todos los aminoácidos presentes en los músculos y la sangre, con excepción de la glicina, pero esta puede ser sintetizada por el cuerpo a partir de otros aminoácidos.

Por lo tanto, la leche es la mejor fuente de todos los aminoácidos necesarios para el desarrollo muscular.

De lo anterior se desprende claramente que las proteínas de diferentes fuentes no tienen el mismo valor en la alimentación.

La proteína ideal sería aquella que contuviera todos los aminoácidos que la paloma necesita en la proporción exacta necesaria para su salud.

Una proteína con estas propiedades se encuentra en la naturaleza, en el huevo de la paloma.

Una vez que la paloma deja el cascarón, depende de la mezcla de proteínas elegida por quien la alimenta.

Por lo tanto, ciertas proteínas contienen los aminoácidos esenciales y se denominan proteínas de alto valor biológico, a diferencia de otras proteínas de bajo valor biológico, donde faltan ciertos aminoácidos esenciales.

Las proteínas animales generalmente tienen un alto valor biológico, por ejemplo, la carne, el

hígado y la leche.

Las proteínas vegetales, por otro lado, tienen un bajo valor biológico por sí solas; sin embargo, mediante una mezcla adecuada de granos es posible suministrar los aminoácidos esenciales, pero solo mediante un exceso de proteína total.

Esto se compensa en cierta medida por el organismo de la paloma, donde el exceso de proteína se convierte en el equivalente a azúcar.

Para una correcta alimentación proteica, debemos tener en cuenta la calidad de los aminoácidos que la componen, así como la cantidad total de proteína.

Quienes estén interesados en estos puntos detallados deberían consultar las publicaciones técnicas pertinentes, que ofrecen un análisis preciso de los componentes de los distintos cereales.

Como guía general sobre el valor de ciertos cereales, las siguientes notas serán útiles.

El maíz tiene una alta palatabilidad y digestibilidad, pero es deficiente como proteína, y las crías alimentadas únicamente con maíz no se desarrollan satisfactoriamente, especialmente en las plumas, que son principalmente proteínas.

También produce lentitud y exceso de grasa.

Los experimentos de digestión muestran que el maíz contiene un 8,4 % de proteínas, un 4,4 % de grasas y un 64 % de carbohidratos.

Los guisantes, las judías, la veza y otras leguminosas contienen un alto contenido proteico y, tras la digestión, aportan un 18 % de proteínas, un 1,2 % de grasas y un 48 % de carbohidratos.

El mijo es similar a la avena y, debido a su brillo, las aves lo distinguen fácilmente.

Al digerirse, aporta un 7 % de proteínas, un 3 % de grasas y un 62 % de carbohidratos.

Las semillas de girasol tienen un alto contenido de grasa (21 %), y su proteína contiene aminoácidos del grupo glicocol, importantes para el crecimiento de las plumas.

El trigo es un cereal agradable al paladar y proporciona un 9 % de proteínas, un 1,1 % de grasas y un 63 % de carbohidratos.

Sin embargo, una dieta basada únicamente en trigo causa trastornos digestivos y pérdida de apetito.

La linaza es un alimento valioso, ya que contiene aproximadamente un 7 % de grasa de fácil asimilación y un 34 % de proteínas.

Es útil durante la muda y ayuda a la formación de nuevas plumas.

La leche y la carne de vaca son las fuentes más ricas de proteínas de alto valor biológico.

Las aves con deficiencia de proteínas a veces intentan complementar su dieta con la alimentación en el campo, cuando pueden complementar su ración proteica con gusanos e insectos, que, por supuesto, están compuestos de proteína animal.

GRASAS

Las grasas y los aceites se encuentran en la mayoría de los cereales en diversas proporciones, y cierta cantidad de grasa es necesaria en la dieta para el correcto mantenimiento de la salud.

La lecitina es el nombre que se da a una sustancia grasa que no se encuentra en las grasas

vegetales, pero sí en proporciones apreciables en la leche y la yema de huevo.

La lecitina se descubrió por primera vez en un extracto de yema de huevo, de ahí su nombre (del griego: lecithos, que significa yema).

También se encuentra en la leche de vaca en una proporción del 1,5 % del contenido proteico.

La lecitina es esencial para la formación del tejido nervioso de la paloma, pero también es esencial, en menor medida, para la formación de todos los tejidos.

CARBOHIDRATOS

Se denomina así a las sustancias presentes en los alimentos que contienen únicamente carbono, hidrógeno y oxígeno, estos dos últimos elementos en la misma proporción que el agua.

Existen muchos ejemplos de carbohidratos, como los diversos almidones, las harinas y los azúcares presentes en los cereales.

Todos los carbohidratos ingeridos se digieren y se transforman en glucosa, que es lo suficientemente pequeña como para ser absorbida por el torrente sanguíneo.

Los diversos almidones presentes en los cereales están compuestos por un gran número de moléculas de glucosa, y las moléculas de almidón son demasiado grandes para ser absorbidas por el torrente sanguíneo hasta que la digestión las descompone.

Los carbohidratos de la dieta son el combustible de la paloma.

Se almacena en el hígado y se libera al torrente sanguíneo cuando es necesario para suministrar energía a las proteínas de los músculos y otros tejidos.

La mayor parte del alimento para palomas se compone de carbohidratos, ya que el consumo de energía por parte de la paloma es mucho mayor que el desgaste de los componentes proteicos de los músculos.

SALES MINERALES

Los principales componentes minerales necesarios en el alimento son la sal común, las sales de calcio y las sales de hierro.

La sal común o cloruro de sodio es una necesidad diaria en la dieta, ya que los riñones de la paloma excretan una pequeña cantidad de sal en la orina junto con otros productos de desecho, y esta sal debe reponerse, ya que la sangre y las células son esencialmente una solución acuosa que contiene aproximadamente un 1 % de sal.

La sal de calcio es necesaria para la formación de los huesos en los pichones en crecimiento y la leche es una fuente muy rica de calcio.

Las sales de hierro son necesarias para la formación de células sanguíneas, pero la cantidad requerida es muy pequeña.

LAS VITAMINAS

Estas son sustancias que se encuentran en cantidades mínimas en el cuerpo, pero su deficiencia provoca un deterioro evidente de la salud.

Por lo tanto, es recomendable asegurar que las aves reciban un suministro adecuado de ali-

mentos ricos en vitaminas.

El siguiente resumen de las propiedades de las vitaminas y de los alimentos que las contienen será útil.

La vitamina A es necesaria para un buen plumaje; se encuentra en alimentos grasos de origen animal, especialmente en el aceite de hígado de bacalao, y en las zanahorias.

La vitamina B contribuye a la nutrición adecuada del tejido nervioso, y las aves que carecen de ella sufren parálisis de los nervios de las patas y no pueden mantenerse en pie.

La vitamina B se encuentra en el germen o plántula del grano (a diferencia de la parte almidonada).

Por lo tanto, el grano molido carece de vitamina B porque el proceso de molienda separa el germen de la masa de almidón, y es esta parte la que se vende como grano.

La levadura de cerveza es rica en vitamina B.

La vitamina C es necesaria para la salud de la piel y los vasos sanguíneos.

Se encuentra principalmente en vegetales verdes y en el jugo de nabo.

La vitamina D es esencial para la formación de los huesos; se encuentra en aceites animales, especialmente en el aceite de hígado de bacalao.

FORMA DE ALIMENTAR

Para empezar, recomiendo la alimentación con tolva (tolva).

Es limpia y menos desperdiciadora, y el colombófilo, con solo un vistazo al entrar al palomar, puede saber si a las aves les falta alimento.

Más adelante, será mejor alimentarlas a mano, comenzando con los granos más grandes y bajando a los más pequeños; este método es ideal para las aves corredoras.

Si se alimenta a mano, se debe usar una campana a la hora de comer.

La mezcla de tolva suele estar compuesta de frijoles, guisantes, vezas, maíz pequeño y trigo, etc.

Esta se puede administrar con seguridad durante la época de cría a partir de marzo, y es una buena dieta con la que los pichones pueden criarse con éxito.

En la época de preguerra, creo que el colombófilo británico era demasiado exigente y tendía a preferir los caros granos importados, especialmente los guisantes de arce pulidos y varios de sus parientes cercanos, la cizaña sueca, etc.

En Bélgica, el colombófilo experimentado rara vez usaba guisantes de Tasmania; dependía en gran medida del grano del país y utilizaba principalmente frijoles, vezas (en una variedad infinita), trigo, etc.

Además, a menudo se encontraban maíz pequeño, linaza y otras semillas pequeñas.

Muchos colombófilos preferían el grano relativamente nuevo; consideraban que los granos pulidos y viejos eran deficientes en vitaminas, etc.

Su método tenía ventajas; la mayoría de sus piensos eran fáciles de conseguir y, sin duda, más baratos que los nuestros.

Más adelante en la temporada, la dieta puede variarse según las condiciones climáticas, y las aves pueden recibir una comida abundante al día durante los meses de invierno.

Considero que un poco de maíz bueno es beneficioso en climas muy fríos, así como una ra-

ción extra de linaza.

Personalmente, creo firmemente en los granos densos, como las judías verdes, como dieta básica en todas las estaciones.

Unas pocas judías contienen más nutrientes y vitaminas que el doble de peso de muchos de los cereales más ligeros.

Las aves deben tener comidas abundantes hasta que finalice la muda; este no es el momento de experimentar con una dieta de cebada, por ejemplo, porque sin una buena muda no se puede esperar una buena temporada de cría ni de carreras al año siguiente.

No suelo alimentar con cebada, aunque sé que muchos de mis amigos más aficionados la recomiendan; al fin y al cabo, es una dieta muy reductora de peso y suele administrarse con la idea de reducir la vitalidad a un estado puramente de subsistencia antes de administrar la dieta abundante de judías, guisantes, etc., para lograr las condiciones necesarias para el apareamiento.

Se dice que las aves se ponen en mejor forma con este régimen, pero prefiero mantenerlas con un peso muscular adecuado en todas las estaciones, ya que con este método hay menos probabilidad de que se produzcan enfermedades e infecciones (desnutrición, etc.) en la colonia.

Prefiero administrar a todas las aves una pequeña dosis de sales de Epsom y una dieta muy ligera durante un día, aproximadamente una semana antes del apareamiento.

Esto tiene el efecto deseado de eliminar el exceso de grasa, y con este sencillo método puedo afirmar con sinceridad que, en cuarenta años de experiencia, nunca he tenido una mala eclosión, ni siquiera una mala temporada de cría, por muy duras que hayan sido las temporadas.

A menudo me dicen que los colombófilos son demasiado generosos con sus palomas y las sobrealimentan.

No es un defecto grave, dentro de unos límites razonables.

En la mayoría de las estaciones utilizo linaza y, cuando es posible, sémola de trigo y arroz; las aves prosperan con estos extras porque, al igual que la raza humana, se cansan de la misma dieta todo el año.

En cuanto al arroz, lo prefiero con cáscara, no como se vende habitualmente para consumo humano.

El arroz preparado y limpio tiene poco valor dietético y prácticamente carece de vitaminas; esto se descubrió en la India durante la alimentación experimental de los nativos, mucho antes de que se descubrieran o siquiera se hablara de las vitaminas.

Los nativos que consumían el arroz tradicional, sin la preparación mecánica que se usa en este país, gozaban de buena salud, mientras que quienes se alimentaban con arroz preparado eran propensos al beriberi y otras enfermedades nerviosas y debilitantes.

Suelo espolvorear un poco de aceite de hígado de bacalao sobre los granos gruesos y secarlos al sol antes de dárselos a las aves.

También he usado aceite de oliva de la misma manera, pero es puramente grasa y no contiene el alto contenido vitamínico del aceite de hígado de bacalao.

Cuando sea necesario, conviene recordar que ambos aceites se pueden administrar eficazmente en cápsulas; son muy beneficiosos durante la muda.

Debería haber mencionado un pequeño detalle sobre la alimentación de los pichones recién destetados.

Es ventajoso darles un poco de trigo de buena calidad justo antes de que se separen de sus padres y continuar con esta alimentación después del destete; opino que prefieren esto a los granos pesados en sus primeros años de vida, probablemente debido a sus picos blandos y poco desarrollados.

Concluiría esta sección sobre alimentación enfatizando la importancia de usar grano de buena calidad y de asegurar su correcto almacenamiento en un lugar seco y ventilado, o en silos adecuados.

Si es posible, será ventajoso usar un silo para maíz, similar al modelo que fabricó el difunto Sr. W. Pearson, de Keighley, Yorks.

Se colocaban toboganes en el silo en dirección a la pequeña salida (similar a los que se usaban para las patatas en las tiendas de comestibles).

Esta salida se controlaba mediante una puerta corrediza de madera y, cuando se usaba o extraía grano, se volteaba o movía el grano restante.

Me temo que el lector podría pensar que es ridículo entrar en todos estos puntos sobre la alimentación de las palomas mensajeras, pero es interesante observar que el entrenador inteligente de caballos de carreras es igual de meticuloso, si no más.

Además, con el racionamiento actual, hay muy pocos granos disponibles, pero debemos esperar tiempos mejores.

AGUA

Opino que las aves deben tener agua limpia dos veces al día.

También estoy a favor de tener agua corriente en el palomar si es posible instalarla.

No me opongo a añadir productos químicos ni tónicos al agua potable, salvo en los casos descritos.

En mis viajes al extranjero, descubrí que los aficionados extranjeros no eran tan cuidadosos con el agua.

Eran comunes los bebederos mal diseñados, y el agua a menudo estaba sucia por los excrementos y pegajosa.

ARENA

Les doy a todas mis aves una buena selección de arena de mar, mortero viejo, polvo de ladrillo rugoso y algunas tejas rojas rotas.

Además, creo firmemente en los minerales preparados por el Sr. Kilpatrick de Belfast.

ENSALADA O ALIMENTO VERDE

Es necesario proporcionar alimento verde, sobre todo a los prisioneros.

Creo que una col (o una verdura) es uno de los mejores.

Normalmente la sumerjo en una solución diluida de sal y la ato en el palomar, ligeramente por encima del suelo.

Esto la mantiene limpia y libre de excrementos, etc.

ENFERMEDADES O DOLENCIAS MENORES

Normalmente trato todas las lesiones accidentales y varias de las enfermedades menores, pero estoy totalmente en contra de cualquier tratamiento prolongado de discapacidades físicas graves y enfermedades infecciosas en palomas, principalmente por el riesgo de mayor contaminación e infección en la colonia, y porque estos casos rara vez son útiles posteriormente como palomas mensajeras.

Si un ave presenta un ligero cambio de color y de apetito (una indisposición temporal debido a que ha recogido algo dañino en el palomar, en el campo o por sobre alimentación), le administro una pequeña dosis de sales de Epsom y le pongo una dieta muy ligera.

La afección suele remitir en muy poco tiempo.

Por supuesto, si estos síntomas son la primera señal de que la salud es mala, se aprecian pronto y elimino al ave.

Una afección común es la inflamación de garganta debido a un resfriado o una infección leve; esta se puede curar fácilmente aplicando una solución de ácido tánico y glicerina sobre las partes afectadas.

Si posteriormente la garganta se cubre con un exudado amarillento o maloliente, se tratará de difteria y la cura es inmediata.

En afecciones oculares simples, como el resfriado tuerto, suelo pintar los párpados con alcohol de alcanfor.

Esto tiene un efecto curativo maravilloso y la afección se cura rápidamente.

El resfriado tuerto se contagia con mucha facilidad y suele contraerse en las canastas de las aves de carrera o en palomares superpoblados.

Se propaga rápidamente y es especialmente frecuente entre los pichones.

En este sentido, es muy interesante recordar que cuando ocurre una epidemia de resfriado tuerto, por ejemplo, en el palomar de los pichones, suele estar asociada a un palomar mal cuidado, con oscuridad, humedad y, a menudo, hacinamiento, y suele presentarse con chancro, diarrea, etc.

En esos momentos, es una de las maneras que tiene la naturaleza de eliminar a los más débiles.

Las aves deben estar en buenas condiciones de higiene y no deben estar hacinadas, de lo contrario, la naturaleza reducirá el número para adaptarlo a la capacidad del palomar.

Los casos de adelgazamiento, debilidad creciente marcada, diarrea persistente, chancro severo y, como se mencionó anteriormente, difteria, se tratan mejor eliminando las afectadas.

Incluso si se logran remediar estas afecciones, las palomas nunca serán buenas corredoras ni reproductoras.

HERIDAS

Todo aficionado debería tener una aguja quirúrgica curva para suturar las heridas en palomas que regresan de carreras o ejercicio dañadas por disparos, cables telefónicos, etc.

Si se hierve un hilo de lino resistente, se obtendrán buenas suturas y un trabajo satisfactorio incluso en manos de un principiante.

Estas heridas suturadas cicatrizan muy rápidamente y el resultado final suele ser bueno.

FRACTURAS

La fractura más común es la de la pata y se puede tratar fácilmente usando un trozo de una caja de cerillas como férula y fijándola con cinta adhesiva o esparadrapo.

Salvo por las afecciones mencionadas, y posiblemente algunas menos importantes, se recomienda al colombófilo no intentar tratar palomas enfermas con ninguno de los tan publicitados remedios medicinales.

Recuerdo que hace muchos años, en compañía de un grupo de buenos colombófilos, visité un palomar en el extranjero.

Nos mostraron unas veinte palomas en diversos estadios de enfermedad y me pidieron consejo sobre ciertos aspectos médicos de algunos casos individuales.

Fue realmente brusco, y molestó un poco a mi amigo: «Descarten el lote».

EJERCICIO

Las palomas, viejas y jóvenes, deben ejercitarse por separado durante la temporada de carreras, dos veces al día, y cada lote debe alimentarse al entrar al palomar.

La campana debe usarse según las indicaciones.

Al principio de la temporada, las palomas deben volar de veinte a treinta minutos por la mañana y por la noche, y a medida que se acercan las carreras largas, el tiempo debe aumentarse a unos cuarenta o sesenta minutos en cada sesión de ejercicio.

No permita que las palomas se posen en el techo del palomar; cuando esto ocurra, alimente solo a aquellos que tengan una buena captura; los demás recordarán pronto la campana cuando llegue la siguiente comida y se adaptarán rápidamente a las reglas.

ENTRENAMIENTO

Quizás sea mejor empezar con los pichones, ya que el principiante podría tenerlos solo para experimentar durante la primera temporada.

Antes de comenzar el entrenamiento, unas tres semanas antes de la primera carrera de pichones, todos los pichones deben ser manipulados y examinados cuidadosamente.

Los que no estén en perfectas condiciones físicas y con una salud óptima deben ser eliminados, ya que solo serán un lastre para el equipo y desaparecerán rápidamente a medida que avance el entrenamiento activo.

Estoy seguro de que muchos pichones entran en entrenamiento sin que se les permita ver el interior de un cesto de entrenamiento.

Suelen ser débiles, por constitución, y un colombófilo entusiasta y bueno puede identificarlos a una edad temprana.

Estas palomas a menudo se niegan a ejercitarse con los pichones normales, aunque en muchos casos tienen buen aspecto.

Nunca intente entrenar a un pichone que se niegue a ejercitarse en casa y se acostumbre demasiado al techo.

Una paloma así solo causará problemas y gastos más adelante, si se conserva.

Quizás no estemos siendo lo suficientemente selectivos en nuestra selección final de pichones para entrenamiento y carreras, y el siguiente incidente puede ser prueba de ello, aun-

que el método adoptado fue innecesariamente cruel.

Recuerdo a mi viejo amigo, el difunto M. Henri Rey, de La Haya, Países Bajos, contándome que un año había criado una maravillosa tanda de pichones.

Los instalaron debidamente en el palomar y parecían haberse adaptado bien.

En ese momento, había contratado a un nuevo encargado del palomar y él mismo tuvo que irse de vacaciones a Francia.

A su regreso, el M. Rey realizó una visita de inspección y se sintió consternado al descubrir que solo quedaba aproximadamente la mitad de sus pichones.

Inmediatamente concluyó que se habían escapado, pero su encargado le informó que los pichones no se habían adaptado a su "trato especial".

Tras más indagaciones, resultó que solo les había dado agua durante tres días y nada de comida.

Los jóvenes que parecían un poco más hambrientos y parecían activos y se mantenían posados, se mantuvieron reservados, y el resto, que estaba acurrucado en un rincón y no se movía, fue destruido.

El Sr. Rey estaba muy molesto y consideraba este un método de selección cruel e inhumano, pero tuvo que admitir que estos pichones, reservados de la forma descrita, volaban excepcionalmente bien, con pocas pérdidas, y posteriormente se encontraban entre las mejores palomas adultas que había tenido.

Cuando los pichones se ejercitan libremente dos veces al día, comen bien y ganan un poco de peso, se consideran aptos para el entrenamiento.

En esta etapa, recomendaría al colombófilo que los enceste una tarde y los deje en la cesta durante la noche.

A primera hora de la mañana, coloque bebederos en la cesta y eche un poco de agua.

Muchas aves beberán; esta es una lección valiosa que les será muy útil más adelante.

Luego, dele una ración ligera de alimento.

Después, haga que las aves abandonen la cesta por la parte frontal abatible y permítales volar alrededor unas cuantas veces y luego atraparlas.

El entrenamiento debe tener como objetivo proporcionarles una buena educación y deben ser entrenadas en distancias cortas al norte, sur, este y oeste antes de colocarlas en la línea de vuelo hacia el primer punto de carrera.

Luego, comience a unas tres millas y continúe, si el clima lo permite, cada dos días hasta seis, diez, veinte, treinta y cuarenta millas.

Intente elegir días propicios y prefiera saltarse una etapa que correr demasiados riesgos; libere las palomas lejos de cables telegráficos, etc, y donde puedan tener una buena vista del campo circundante.

Siempre es mejor liberarlas temprano en el día para que tengan tiempo de volver a casa si encuentran alguna dificultad inesperada.

El viento del este y la neblina que lo acompaña son condiciones que deben evitarse, en la medida de lo posible, ya que parecen interferir con la orientación o el rastreo de las palomas.

Con tiempo despejado, las palomas suelen regresar a casa en grupo, pero con nubes y llovizna, se dispersan y regresan en una formación irregular.

Se les debe alimentar a su regreso y se les debe animar a que practiquen buenas entradas.

Si se sigue el método sugerido, no decepcionarán al comienzo de las carreras.

Siempre es mejor tener cuidado con las aves más grandes y poco desarrolladas, detenerlas pronto y dejar que las palomas pequeñas y bien desarrolladas pasen a las últimas carreras.

Curiosamente, en la práctica, las hembras pequeñas, a menudo con mucha muda y con el plumaje muy descuidado, son las que tienen un rendimiento más consistente.

A veces, durante un entrenamiento de lanzamiento, se produce una gran cantidad de aves —por mal tiempo y lluvia, viento del este y neblina, liberación tardía, pérdida de conexiones ferroviarias y liberación descuidada— o al encontrarse en el camino con un grupo grande de aves ejercitándose o cruzando en entrenamiento en dirección opuesta.

En estas condiciones adversas, los pichones se dispersan y muchos se pierden.

Las que regresan se pueden clasificar en dos categorías:

(1) La mayoría estarán delgadas y desmayadas, y

(2) El resto puede estar sobrecargado y exhausto sin posibilidad de recuperación.

Recomiendo darles una oportunidad a todas.

Dales una alimentación ligera y dos o tres días de descanso completo.

Al final de ese tiempo, te verás obligado a deshacerte de las pocas que estén claramente acabadas.

Después, las mejores pueden hacer ejercicio un rato y pronto podrán ser enviadas a una prueba corta.

Esto suele restaurar su confianza y pueden reanudar su entrenamiento interrumpido sin contratiempos.

La experiencia demuestra que, tras un fracaso o revés de este tipo, las palomas que sobreviven suelen tener un buen desempeño en sus carreras y convertirse en excelentes palomas adultas años después.

Han tenido que trabajar por su cuenta y han sacado provecho de la lección.

El Sr. W. T. Rimer, de Corbridge, famoso colombófilo del norte de Inglaterra, autor del prólogo de este libro.

Él cree en la importancia de trabajar mucho con sus palomas, como se muestra aquí.

Aunque esto suele ser cierto con las palomas jóvenes, me temo que no es tan cierto cuando las palomas adultas se ven envueltas en un verdadero fracaso.

Las palomas adultas son como los elefantes: ¡nunca olvidan!

Después de un evento así, a menudo se vuelven astutos y luego simplemente se dedican a volar, no a competir.

En mi opinión, el pichón que adquiere buena experiencia en las primeras carreras probablemente se convertirá en un excelente pichón adulto.

Le doy mucha importancia a mis propios pichones, que son capaces de completar el programa hasta la última carrera.

Conozco a muchos colombófilos exitosos que adoptan otros métodos y son muy cuidadosos con los pichones de carreras, pero personalmente nunca he tenido un pichón realmente bueno que no haya sido entrenado de joven, ni he tenido un pichón criado tardíamente que haya resultado ser un as en la edad adulta.

La educación del pichón debe comenzar en las primeras etapas de la vida y continuar de forma normal en las temporadas siguientes.

Hay colombófilos que envían a sus pichones a las primeras carreras sin entrenamiento previo y, por supuesto, dependen de la gran masa para que sus pichones regresen a casa.

En su ignorancia, se jactan abiertamente de que las buenas aves no necesitan entrenamiento.

Esto es una tontería, y, personalmente, no tengo tiempo para este tipo de cosas.

Rara vez permito que los pichones se apareen; es muy dudoso que la reproducción produzca mayor velocidad.

Sin embargo, si decide probar con un macho joven, aparearlo con una hembra vieja y tranquila.

Nunca permita que las pichonas pongan si puede evitarlo; si deben aparearse, generalmente adoptarán la postura de "huevos falsos" sin poner, y en esas condiciones puede obtener la carrera que desea.

El difunto M. Stassart llevó a cabo su entrenamiento de pichones siguiendo los lineamientos sugeridos aquí y fue uno de los mejores corredores de pichones del mundo.

Por otro lado, el difunto Sr. Tremmery (famoso por el "Campeón Le Fynen") nunca entrenó a sus pichones, y solo comenzó a entrenar a sus palomas cuando eran añales.

Entonces los entrenaban hasta 160 kms (cien millas).

Fue enfático en su opinión de que se debe permitir que los ejemplares jóvenes se desarrollen y crezcan antes de someterlos a la tensión de las carreras.

Al igual que el Sr. Stassart, tenía un historial excelente, pero solo con aves adultas.

Recuerdo que, en una ocasión, al visitarlo, cogí una hembra escamada; después de examinarla, dije que, en mi opinión, era una ganadora muy probable de carreras de 800 kilómetros.

Había volado 160 kilómetros de añal y 400 kilómetros a los dos años.

Ganó el Nacional Belga de Pau a los tres años.

El entrenamiento de las aves adultas puede llevarse a cabo de la misma manera que se describió para las aves jóvenes, pero además hay otros factores que deben considerarse.

No necesitarán tantos lanzamientos de entrenamiento, especialmente en las etapas cortas, y serán muy capaces de dar saltos cuando sea necesario.

Es recomendable, antes de comenzar el entrenamiento de palomas adultas, examinar cuidadosamente a todas las palomas y asegurarse de que no presenten ninguna afección incapacitante, como plumas rotas, heridas leves en el cuerpo, formación de abscesos, afecciones de garganta, etc.

Muchas de estas afecciones pasan desapercibidas cuando las palomas se mueven por el suelo del palomar.

Si todo va bien, prefiero organizar mis apareamientos con antelación para que las palomas estén incubando sus segundos huevos cuando comience el entrenamiento serio.

Creo que es recomendable evitar que el equipo de carreras alimente a los pichones; normalmente les permito que empollen su primera pareja y los alimento durante unos diez días.

Posteriormente, los pichones pueden criarse completamente con la ayuda de nodrizas.

Otro punto a recordar: no se debe dar a las palomas adultas una comida copiosa antes de encestarlas para las primeras carreras.

Este descuido a menudo dificulta el viaje y las afecta negativamente en la carrera.

Toda la arenilla y la sal deben retirarse del palomar el día anterior al enceste.

Recuerde mantener el método recomendado para una captura rápida; la campana debe usarse durante cada comida.

El ejercicio debe seguir las pautas sugeridas para los pichones.

Dentro de las dos semanas posteriores a las carreras largas, el ejercicio matutino debe realizarse lo más cerca posible del amanecer y el ejercicio vespertino debe realizarse a una hora tardía.

Siguiendo este método, se acostumbra a las aves a las condiciones predominantes en las liberaciones matutinas y también a volar hasta una hora muy tardía por la tarde.

Con quince o dieciséis horas de vuelo, estos puntos pueden ser de vital importancia en las carreras largas.

Como regla general, un ave que tiene un buen desempeño en una carrera determinada suele repetirlo en temporadas posteriores, según el principio conocido de "caballos para carreras".

Siempre es útil tener en cuenta estos puntos al seleccionar las inscripciones para pools, nominaciones, etc.

Prefiero ciertas condiciones de anidación al competir en las carreras largas.

En esos momentos, prefiero que las aves estén empollando durante diez o doce días, y considero que en todos los casos esta es una condición segura.

A menudo le doy a la hembra, que está sentada como se mencionó, un polluelo muy pequeño para que lo acaricie unas horas antes de encestar.

AL RETORNO

Después de cada carrera, conviene darles un poco de trigo y maíz pequeño; esto tiene un efecto ligeramente laxante y es beneficioso.

Al día siguiente, las corredoras, por supuesto, volverán a la dieta normal.

También es necesario bañar a las aves después de su regreso de la carrera o, como muy tarde, a la mañana siguiente; esto ayuda a aliviar cualquier dolor o rigidez en las alas y es un excelente reconstituyente o tónico.

Aunque, por lo general, los candidatos a largas distancias no ganan en las carreras de corta distancia, el colombófilo no debe desanimarse.

LAS CARRERAS LARGAS

Las palomas se preparan para una carrera de larga distancia y se hace todo lo posible para que estén en su mejor forma física en ese momento.

Por lo tanto, no se puede esperar la mejor condición física durante toda la temporada de carreras.

En la práctica, conseguir que una paloma esté en su mejor forma dos o tres veces en una temporada es todo un logro.

Otro punto a destacar: unas tres o cuatro semanas antes de la última carrera, se debe dar a las palomas un poco de alpiste después del ejercicio vespertino y después de la cena.

Les encanta este bocado.

Por supuesto, esta semilla solo debe administrarse cuando las palomas hayan tomado sus frijoles, etc.

Al tratar con una paloma con amplia experiencia en carreras, recuerde siempre que puede descansar antes de la carrera más larga y saltar incluso 400 kilómetros con seguridad.

Un ave así suele ofrecer un rendimiento magnífico si se la trata de esta manera.

Otra sugerencia puede ser útil en las carreras largas: suele haber una semana de descanso en el programa de carreras antes de la carrera más larga.

Es muy ventajoso enviar a los candidatos de larga distancia a una prueba corta aproximadamente una semana antes del enceste; una distancia de 48 a 80 kilómetros es suficiente.

Esto les ayudará a perfeccionar sus habilidades.

Al encestar para las últimas carreras, suelo aplicar un poco de aceite, ya sea de oliva, en las patas y pies de todos los competidores.

Se debe aplicar con un pincel pequeño y nunca en exceso.

Esto evita la contaminación de los pies con los excrementos de las cestas y es siempre un punto más a tener en cuenta para la comodidad de los candidatos.

En conclusión, me gustaría que el joven colombófilo se fijara un ideal alto en las carreras de larga distancia.

Que no se conforme con una sola buena actuación en las carreras nacionales, sino que se esfuerce por repetirlo año tras año, y si es posible con la misma ave o las mismas aves.

Si logra esto, tendrá palomas con la madera de las campeonas, y el futuro de la paloma mensajera británica estará en buenas manos.

Tras la Segunda Guerra Mundial, creo firmemente que hoy en día las mejores palomas mensajeras del mundo se encuentran en estas islas.

Nos corresponderá a nosotros seguir conservando nuestro legado.

FIN